



Test de mesa basculante

La prueba de la mesa inclinada es un procedimiento al que se someten pacientes que han tenido desmayo, pérdida de conciencia o síncope con el fin de investigar la respuesta del organismo a los cambios de posición, en especial al reto ortostático que implica la posición de pie.

La prueba se realiza en una mesa o camilla que puede fijarse firmemente al piso, en la que el paciente se acuesta y es llevado de cero grados o posición acostada con la boca hacia arriba hasta la posición de inclinación con angulación que puede ir de 60 a 90 grados. Antes, durante y después de la prueba se monitoriza o vigilan los síntomas que pueda experimentar tales como mareo, sensación de cabeza hueca o ligera, trastornos, desmayo mientras que simultáneamente y de manera continua se registran la frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno en la sangre y otras variables fisiológicas involucradas en mantener el equilibrio del organismo

Apreciado usuario, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para el día de tu cita:

Recomendaciones

- Llega 30 minutos antes de la cita para el proceso de facturación.
- Lleva los siguientes documentos:
 - Orden médica.
 - Autorización de la entidad a nombre de Clínica General del Norte. (Enfísico o en medio digital)
 - Historia clínica.
 - Documento de identidad.
 - El valor del copago, si aplica.
 - Si tienes estudios médicos anteriores que estén relacionados con el examen a realizar, debes presentarlos.
- Si el paciente es menor de edad o adulto con alguna condición especial o limitación de la movilidad debe venir acompañado.
- Lleva ropa cómoda fácil de quitar y poner (ropa deportiva).
- Si presentas inconvenientes de salud como gripa, fiebre, diarreas, erupciones cutáneas, debes informar oportunamente al médico tratante o al personal responsable de la realización del estudio.
- No laves objetos de valor.
- La dirección para asistir a tu cita es Cra. 49 No. 70-51 puerta 1.

Preparación

- Debes asistir en ayuno de 6 horas
- Asiste con un acompañante
- Deberás suspender 3 días antes los siguientes medicamentos: Metoprolol, Carvedilol, Bisoprolol, Nebivolol, Verapamilo y 7 días antes Amiodarona y Propafenona.